

Click to verify

























elevado, con un 27% de incremento. Presentaciones y formas de Administración Gel en tubo con 1 gr de progesterona, contiene 1 aplicador. Se comercializa por el laboratorio Besins Internacional. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Gel para dolor de senos No 2.5 gr 1 Gel para infertilidad No 80 gr 1 Gel para deficiencia de progesterona No 25 a 100 gr 2 \*Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico\* Se recomienda consultar a tu médico antes de tomar si estas en sospecha de estar embarazada, algún sangrado anormal, si tienes algún tipo de cáncer, sobretodo de hígado ya que éste se encarga de metabolizar este fármaco. Para el dolor de senos, se debe aplicar en ambos senos, la cantidad del dosificador. Para la aplicación del gel debe ser por vía vaginal, debes lavarte las manos con agua y jabón, acostarte sobre una superficie plana y cómoda, flexionar las piernas e introducir el aplicador lo más adentro que puedas, después de la aplicación se recomienda permanecer acostada aproximadamente de 20 a 30 minutos, para lograr la buena absorción de Premastan. Medicamento en niños: No se recomienda la administración en niños, ya que aún no está demostrada su seguridad, beneficio y efectividad. Generales: No administrar a niños, durante el embarazo, cáncer de mama, hiperlipidemias (lípidos altos en sangre) y personas con problemas de várices. Tener precaución con enfermedades como asma o problemas del corazón. No conducir ya que Premastan puede provocar vértigo transitorio. Alergias: No consumir en caso de ser alérgico a la progesterona o al aceite de maní. Mezcla con Alcohol: La combinación con alcohol disminuye la efectividad de Premastan. Mezcla con otros medicamentos: Fenobarbital, fenitoina y carbamazepina disminuyen la biodisponibilidad, esto es, tarda más en ejercer efecto. Acelera el metabolismo de los anticonceptivos orales. Rifampicina hace que se produzca más rápido el efecto de Premastan. Compatibilidad de Premastan en Embarazo y Lactancia EMBARAZO ALTO Premastan no es compatible con el embarazo, tiene un riesgo alto y no se puede utilizar porque pone en peligro el curso normal del embarazo, según el prospecto del medicamento se pueden producir alteraciones en el feto y/o la interrupción del embarazo. Premastan es compatible con la lactancia materna, presenta un riesgo bajo por lo cual puede usarse. La página e-lactancia menciona que se excreta en pequeñas cantidades en la leche materna, pero es tan poca que no provoca problemas para el niño ni para la mamá, aún así debe evitarse su consumo, al menos que sea extremadamente necesario. Efectos Secundarios Los efectos adversos son raros, cuando se llegan a presentar se asocian a cambios en el ciclo menstrual y/o mayor sangrado durante la menstruación. Piel: rash cutáneo, dermatitis, acné, urticaria, resequedad. Sistema nervioso: dolor de cabeza, cansancio, ansiedad, irritabilidad, arrebatos emocionales, vértigo, mareo. Metabólico: aumento de peso, apetito disminuido. Sexual: aumento o disminución de la libido, dolor al tener relaciones sexuales Aparato digestivo: náusea, vómito, diarrea, estreñimiento. Consulta de inmediato a un médico si alguno de los síntomas antes mencionados se presentan.