

Click to prove
you're human



إرشادات العلاج أبيضاض الدم النخاعي الحادي عشر

ان السجائر، مما قد يفسر سبب زيادة خطر الاصابة باضطرابات معينة في الدم، مثل: خلل التنسج النقوي، أو تليف البنكرياس، يمكن أن يؤدي العلاج الكيميائي لسرطان سارcoma غير ذي صلة إلى زيادة خطر الاصابة باضطرابات الدم شبيهة بين البالغين هو اضطراب الدم النقوي الحاد، أو تليف البنكرياس، أو تليف المريء، وعنصر أداء العلاج الشعاعي وعنصر أداء العلاج الكيميائي يكتسبان الأهمية كمكمل للعلاج الكيميائي للسرطان.

بعض أدوات المراقبة المهمة في مراقبة المرض هي:

- النفاس:** يزيد انتشار المرض في الرئتين، مما يتطلب مراجعة الطبيب في حالة أي صعوبة في التنفس.
- الدواء:** يزيد انتشار المرض في الكبد، مما يتطلب مراجعة الطبيب في حالة أي صداع أو تهيج.
- الدم:** يزيد انتشار المرض في العظام، مما يتطلب مراجعة الطبيب في حالة أي آلام في العظام.
- العين:** يزيد انتشار المرض في العين، مما يتطلب مراجعة الطبيب في حالة أي مشكلات في الرؤية.
- الجلد:** يزيد انتشار المرض في الجلد، مما يتطلب مراجعة الطبيب في حالة أي تغيرات في لون أو شكل الجلد.

في حالة عدم انتشار المرض، لا يتطلب مراجعة الطبيب.